

喘息のくすり一覧

監修 / 日本アレルギー協会理事長 東京大学名誉教授 宮本 昭正

この一覧表の使用方法（医師と患者の相互理解を深めるために）

- (1) 初診時、従来使われていた薬剤の確認に。
- (2) 投薬時、本一覧を見せながら説明することにより誤認・誤用を防げる。
- (3) 再診時、服用された薬剤の効果を正しく確認できる。
- (4) 通常用量*が示されている。

*用量は各薬剤の通常用量のみを示しています。使用時には、添付文書を確認してください。

● 喘息治療の目標 ●

- 健常人と変わらない日常生活が送れること。
正常な発育が保たれること。
- 正常に近い呼吸機能を維持すること。
 - ・ PEFの変動が予測値の20%未満。
 - ・ PEFが予測値の80%以上。
- 夜間や早朝の咳や呼吸困難がなく十分な夜間睡眠が可能なこと。
- 喘息発作が起こらないこと。
- 喘息死の回避。
- 治療薬による副作用がないこと。
- 非可逆的な気道リモデリングへの進展を防ぐこと。

（喘息予防・管理ガイドライン2009）より

アドエア 100・250・500ディスクス 1吸入/回、2回/日(成人)、50・125・250エアゾール 2吸入/回、2回/日(成人)
100ディスクス 1吸入/回、2回/日、50エアゾール 1~2吸入/回、2回/日(小児)

60吸入用 100 ディスクス*2



250 ディスクス*3



500 ディスクス*4



50エアゾール
120吸入用*5



125エアゾール
120吸入用*6



28吸入用 100 ディスクス*2



250 ディスクス*3



500 ディスクス*4



250エアゾール
120吸入用*7



シムビコート
タービュヘイラー
30吸入



シムビコート
タービュヘイラー
60吸入



1~4吸入/回、2回/日(成人) 1~4吸入/回、2回/日(成人)

*1 喘息治療配合剤：ステロイド薬と長時間作用型 β_2 刺激薬の配合剤

*2 100ディスクス：1吸入 サルメテロール50 μ g 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル100 μ g含有

*3 250ディスクス：1吸入 サルメテロール50 μ g 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル250 μ g含有

*4 500ディスクス：1吸入 サルメテロール50 μ g 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル500 μ g含有

*5 50エアゾール120吸入用：1吸入 サルメテロール25 μ g 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル50 μ g含有

*6 125エアゾール120吸入用：1吸入 サルメテロール25 μ g 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル125 μ g含有

*7 250エアゾール120吸入用：1吸入 サルメテロール25 μ g 及びフルチカゾンプロピオン酸エステル250 μ g含有

フルタイド 100~400 μ g/回、2回/日(成人) 50~100 μ g/回、2回/日(小児)

50 ディスクス



100 ディスクス



200 ディスクス



50 μ gエアゾール
120吸入用



100 μ gエアゾール
60吸入用



50 ロタディスク



100 ロタディスク



200 ロタディスク



ディスクヘラー



キュバール50
エアゾール



2吸入/回、2回/日 (成人)
1吸入/回、2回/日 (小児)

キュバール100
エアゾール



1吸入/回
2回/日 (成人)

アズマネックス ツイストヘラー
100 μ g 60吸入



100 μ g/回、2回/日 (成人)

オルベスコ 50 μ g
インヘラー112吸入用



オルベスコ 100 μ g
インヘラー112吸入用




オルベスコ 200 μ g
インヘラー56吸入用




100~400 μ g/回
1回/日 (成人)


パルミコート100 μ g
タービュヘイラー
112吸入



パルミコート200 μ g
タービュヘイラー
56吸入



パルミコート200 μ g
タービュヘイラー
112吸入



100~400 μ g/回、2回/日 (成人)

パルミコート吸入液
0.25 mg 0.5 mg



0.25 mg/回、2回/日
または
0.5 mg/回、1回/日
(6ヵ月以上5歳未満
の乳幼児)

プレドニゾン錠 1 mg



5~60錠/日、1~4回/日 (成人)

プレドニゾン錠 5 mg




1~12錠/日、1~4回/日 (成人)

メドロール錠 2 mg



2~24錠/日、1~4回/日 (成人)

デカドロン錠 0.5 mg



1~16錠/日、1~4回/日 (成人)

リンデロン錠 0.5 mg



1~16錠/日、1~4回/日 (成人)

① キサンチン誘導体

テオドール錠 50mg



4錠/回、2回/日 (成人)
または8錠/回、1回/日 (成人)
2~4錠/回、2回/日 (小児)

テオドール錠 100mg



2錠/回、2回/日 (成人)
または4錠/回、1回/日 (成人)
1~2錠/回、2回/日 (小児)

テオドール錠 200mg




1錠/回、2回/日 (成人)
または2錠/回、1回/日 (成人)

テオロング錠 200mg



1錠/回、2回/日 (成人)

スロービッドカプセル 100mg



2カプセル/回、2回/日 (成人)
1~2カプセル/回、2回/日 (小児)

スロービッドカプセル 200mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)

ユニフィルLA錠 100mg



4錠/回、1回/日 (成人)

ユニフィルLA錠 200mg



2錠/回、1回/日 (成人)

ユニコン錠 400




1錠/回、1回/日 (成人)

ネオフィリン錠 100mg



3~4錠/日、3~4回/日 (成人)
2~4mg/kg/回、3~4回/日 (小児)

モノフィリン錠 100mg



2~3錠/日、2~3回/日 (成人)

アストフィリン配合錠



1~2錠/回、2~3回/日 (成人)

② 交感神経刺激薬

セレベント 50μg/回、2回/日 (成人) 25μg/回、2回/日 (小児)

50 ディスカス



25 ロタディスク 50 ロタディスク



ディスクヘラー



ベネトリン
吸入液
0.5%



0.3~0.5mL/回 (成人)
0.1~0.3mL/回 (小児)

ベネトリン
シロップ
0.04%



0.75mL/kg/日
3回/日 (乳幼児)

サルタノール
インヘラー
100μg



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

アイロミール
エアゾール
100μg



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

ペロテック
エロゾル
100



2吸入/回 (成人)

ストメリンD
エアゾール



1吸入/回 (成人)

② 交感神経刺激薬

メブチン
10 μ g エアー
100吸入



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

メブチンキッド
5 μ g エアー
100吸入



4吸入/回 (成人)
2吸入/回 (小児)

メブチン
クリックヘラー
10 μ g



2吸入/回 (成人)
1吸入/回 (小児)

メブチン
吸入液
0.01%



0.3~0.5mL/回 (成人)
0.1~0.3mL/回 (小児)

メブチン吸入液
ユニット
0.3mL 0.5mL



アスプールの液
(1%)




0.3mL/回 (成人)

ホクナリンテープ



0.5mg/回、1回/日
(0.5~3歳未満)



1mg/回、1回/日
(3~9歳未満)



2mg/回、1回/日
(成人・9歳以上)


(胸部、背部、上腕部のいずれかに貼付)

ホクナリン錠 1mg



1錠/回、2回/日 (成人)

ホクナリンドライシロップ
0.1% 小児用



40mg/kg/日、2回/日 (小児)

ベネトリン錠 2mg



2錠/回、3回/日 (成人)
0.3mg/kg/回、3回/日
(小児)

ブリカニール錠 2mg




2錠/回、3回/日 (成人)
1錠/回、3回/日 (6歳以上)
1/2錠/回、3回/日 (5歳以下)

ベラチン錠 1mg



1錠/回、2回/日 (成人)

ベラチンドライシロップ
小児用 0.1%



40mg/kg/日、2回/日 (小児)

メブチンミニ錠 25 μ g



2錠/回、1~2回/日 (成人)
1錠/回、1~2回/日 (6歳以上の
小児)

メブチン錠 50 μ g



1錠/回、1~2回/日 (成人)

ペロテック錠 2.5mg



1錠/回、3回/日

アトック錠 40 μ g



160 μ g/日、2回/日 (成人)
4 μ g/kg/回、2~3回/日
(小児)

スピロベント錠 10 μ g



2錠/回、2回/日 (成人)
0.3 μ g/kg/回、2回/日
(5歳以上の小児)

イソパール・P カプセル



2カプセル/回、3回/日 (成人)
1カプセル/回、3回/日 (6歳以上の小児)

アロテック錠 10mg



1錠/回、3回/日 (成人)

③ 副交感神経遮断薬

アトロベント
エロゾル 20 μ g



1~2吸入/回
3~4回/日 (成人)

テルシガン
エロゾル 100 μ g



1~2吸入/回
3回/日 (成人)

① ロイコトリエン拮抗薬

オノンカプセル 112.5mg



450mg/日、2回/日 (成人)

アコレート錠 20mg



40~80mg/日、2回/日 (成人)

アコレート錠 40mg



40~80mg/日、2回/日 (成人)

シングレアチュアブル錠 5mg



1錠/回、1回/日 (6歳以上の小児)

シングレア錠 5mg




2錠/回、1回/日 (成人)

シングレア錠 10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

シングレア細粒 4mg



4mg/回、1回/日 (1歳以上6歳未満の小児)

キプレスチュアブル錠 5mg



1錠/回、1回/日 (6歳以上の小児)

キプレス錠 5mg




2錠/回、1回/日 (成人)

キプレス錠 10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

キプレス細粒 4mg



4mg/回、1回/日 (1歳以上6歳未満の小児)

② メディエーター遊離抑制薬

インタール
エアロゾル 1mg

2吸入/回、4回/日
(成人・小児)



アレギサル錠 5mg



1錠/回、2回/日 (5~11歳未満)

アレギサル錠 10mg




1錠/回、2回/日 (成人・11歳以上)

アレギサルドライシロップ 0.5%




0.2mg/kg/回、2回/日 (小児)

リザベンカプセル 100mg



1カプセル/回、3回/日 (成人)

ソルファ 50mg 錠



25~50mg/日、3回/日 (成人)

② メディエーター遊離抑制薬

ペミラストン錠5mg



1錠/回、2回/日 (5~11歳未満)

ペミラストン錠10mg



1錠/回、2回/日 (成人・11歳以上)

ペミラストンドライシロップ0.5%



0.2mg/kg/回、2回/日 (小児)

ロメット錠150mg



1錠/回、2回/日 (成人)

ケタスカプセル10mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)


タザレストカプセル75mg



1カプセル/回、3回/日 (成人)

③ ヒスタミンH₁拮抗薬

ザジテンカプセル1mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)

アゼブチン錠1mg



2錠/回、2回/日 (成人)

ゼスラン錠3mg



2錠/回、2回/日 (成人)

ニボラジン錠3mg



2錠/回、2回/日 (成人)

アレジオン錠10



2錠/回、1回/日 (成人)

アレジオン錠20



1錠/回、1回/日 (成人)

④ トロンボキサンA₂合成阻害薬

ベガ錠100mg



400mg/日、2回/日 (成人)

ドメナン錠200mg



400mg/日、2回/日 (成人)

⑤ トロンボキサンA₂拮抗薬

プロニカ錠40



2錠/回、1回/日 (成人)


プロニカ錠80



1錠/回、1回/日 (成人)

⑥ TH2サイトカイン阻害薬

アイピーディカプセル100



1カプセル/回、3回/日 (成人)

ツムラ-19 (ツムラ小青竜湯エキス顆粒)



9g/日、2~3回/日 (成人)

ツムラ-29 (ツムラ麦門冬湯エキス顆粒)




9g/日、2~3回/日 (成人)

ツムラ-96 (ツムラ柴朴湯エキス顆粒)




7.5g/日、2~3回/日 (成人)

N19 (コタロー-小青竜湯エキス細粒)




7.5g/日、2~3回/日 (成人)

N29 (コタロー-麦門冬湯エキス細粒)




15g/日、2~3回/日 (成人)

N55 (コタロー-麻杏甘石湯エキス細粒)




6g/日、2~3回/日 (成人)

EK-19 (クラシエ小青竜湯エキス細粒)



6g/日、2~3回/日 (成人)

EKT-19 (クラシエ小青竜湯エキス錠)




18錠/日、2~3回/日 (成人)

EK-96 (クラシエ柴朴湯エキス細粒)




7.5g/日、2~3回/日 (成人)

KB-19 (クラシエ小青竜湯エキス細粒)



6g/日、2~3回/日 (成人)

KB-96 (クラシエ柴朴湯エキス細粒)




7.5g/日、2~3回/日 (成人)

ムコソルバン錠
15mg



1錠/回、3回/日 (成人)

ムコソルバンLカプセル
45mg



1カプセル/回、1回/日 (成人)

ムコダイン錠
250mg



2錠/回、3回/日 (成人)

ムコダイン錠
500mg



1錠/回、3回/日 (成人)

クリアナール錠200mg



2錠/回、3回/日 (成人)

スベリア錠200



2錠/回、3回/日 (成人)

*写真の大きさは、原則として錠剤は原寸です。

*用法・用量は『日本医薬品集 医療薬 2010年版』(株)じほう、2009)の記載の通常用量によります。使用時には、各社添付文書を確認してください。

喘息のくすり一覧

監修/日本アレルギー協会理事長 宮本昭正
東京大学名誉教授

発行/ライフサイエンス出版
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-7
TEL (03) 3664-7900

提供/グラクソ・スミスクライン株式会社

© Life Science Publishing, 2010