

赤ちゃんの予防接種



Q1 どうして予防接種が必要なの?

予防接種が出来る前、麻疹(はしか) は肺炎、 脳炎等の合併症で年間数千人の方が亡くなって いました。 近年は予防接種のおかげで年に数 人となっています。

百日咳や日本脳炎など、すべての予防接種で防げる病気も同様に予防接種をすることによって激減しています。

また、予防接種をしないで罹ってしまうと、 本人がつらい思いをするだけでなく、接種の対 象年齢になる前の子どもにも感染させてしまう ことになります。

Q2 予防接種とは?

ではどのようにして予防接種は感染症を防ぐのでしょうか。 人は感染症に罹ると、その病原に対する免疫ができます。 その免疫が次の感染を防ぎます。 予防接種は自然に感染する前に人工的に免疫を作り、感染を予防するのです。

Q3 副反応が心配です…

本当に重篤な副反応は非常に稀で、すべて のワクチンで効果の方が大きくなっています。 不安のある方は、主治医の先生と相談の上 接種をしてください。

Q4 定期と任意どこが違うの?

「任意接種」というとやってもやらなくてもよいように聞こえますが、単に公費で接種ができないということです。 おたふくかぜに罹れば髄膜炎・睾丸炎・卵巣炎などの合併症がありますし、最近は特に難聴が問題となっています。従いまして「おたふくかぜワクチン」等の任意のワクチンもぜひ受けていただきたいと思います。

Q5 そんなに多く 一緒に受けても大丈夫?

日本小児科学会は、複数のワクチンを同時に接種しても副反応が増えるわけでもなく、効果が減ることもないとしています。 現在ワクチンの種類はたくさんありますが、早期に免疫をつけるためにも、同時接種をお勧めします。

ことも急病電話組設

受診するべきかどうか迷ったら

#8000

更日夜7:00~翌朝6:00

ダイヤル回線・IP 電話・光電話・銚子市からは ☎ 043 (242) 9939

2017年4月版

予防接種スケジュール

大切な子どもをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。このスケジュールはNPO法人 VPDを知って、子どもを守ろうの会によるもっとも早期に免疫をつけるための提案です。お子さまの予防接種に関しては、地域ごとの接種方法やVPDの流行状況に応じて、かかりつけ医と相談のうえスケジュールを立てましょう。

ワクチン名	接種済み	** 0 1 2 3 4 5 6 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	7 8 9 10 11 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	(1) 2 3 4 (1) 2 3 4 (2) 2 3 4 (3) 2 3 4	5 6 7 8 月 4 4 4 日 月 月 月 月 月	9 10 11 2 3	4 5 歳 歳	6 7 ***	(満年齢) 8 9 10 11 12 13
不清的 B型肝炎 (母子廢染予防を除く)	定期	0	1)歳のうちに3回接種が。 1歳以上でも未接種の場	必要。3回目は2回目か 合は、できるだけ早く3	0歳のうちに3回接種が必要。3回目は2回目から4-5か月の間隔をあけて受けます。 1歳以上でも未接種の場合は、できるだけ早く受けることをおすすめします。(任意接種)	受けます。 す。(任意接種)		
まっていて (単) 口タウイルス	任意 1個		ロタウイルスワク 遅くとも生後14)	ロタウイルスワクチンには、1価ワクチンと5価ワクチンがあります。 還くとち生後14週6日末でに接種を開始し、それぞれの必要接種回数を受けましょう。	と5価ワクチンがありまし、それぞれの必要接れ	:す。 重回数を受けましょう。			
高端にブ	定期	↑		0					二種混合 (DT):
(列) 小児用肺炎球菌	定期	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	早期に完了するには、 同時接種で受ける ことが重要です。	9	百日七 10受(2)	百日せきの感染予防の目的で 「回受けます。(任意接種) WHOも 7.0時間の治地発達を推開 アニュー (※)	0 # # %		11歳で追加接種 (接種対象11-12歳)
添数 四種混合 (DPT-IPV) 定期	日日日日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日			9 /		A TO KEEP TENENTS OF THE PROPERTY OF THE PROPE	<u>.</u>	(Θ
BCG	定期		1	1歳の誕生日 ましょう。 ヒ 説合・MR・X	1歳の誕生日が来たら同時接種で受けましょう。ヒブ・小児用肺炎球菌・四種ましょう。ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・MR・水痘・おたふくかぜの6本	力種と			
・ MR (東) (東しん風しん混合)	定期	集団接種の地域では、同時接種で受けられません。	2.≣	を同時接種の	を同時接種で受けることもできます。			(\$) (\$) (4)	幼稚園、保育園の年長の 4月~6月がおすすめ
本 の25年) (みずぼうそう)	定期			\$		1	かわった。ア	14 K 14 OF	かかったアンがない。「中の同場に手」、よう、(※)
(変数) おたふくかぜ	任意							**************************************	60604
孫對 日本脳炎	定期		標準的には3歳から接種しますが、 生後6か月から受けられます。	種しますが、 れます。		—Ŏ	1		9
「類」 インフルエンザ	任意			每年、105	毎年、10月から11月ごろに接種しましょう。	ましょう。		9歳(接	9歳で追加接種(接種対象9-12歳)
一种 A型肝炎	任意			1歳から受	(けられます。1回目の2	歳から受けられます。1回目の2-4週後に2回目、その約半年後に3回目を接種します。	年後に3回目を指	後種します。	
不満化 HPV (ヒトバビローマウイルス)	定期					中学1年で接種開始(接種対象:小6から高1の女子) 2価と4価があり、ワクチンによってスケジュールが異なります。	接種対象:小6ガ チンによってス!	ら高1の女子) ケジュールが異	なります。
不能 髄膜炎菌	任意	2歳から	2歳から受けられます。海外留学や高校や大学で寮生活をする人などは接種がすすめられます。	高校や大学で寮生活を	する人などは接種がす	すめられます。)			

い温 前 **万部** 不活化ワクチン

定期予防接種の対象年齢 多くは有料(自己負担)。自治体によっては公費助成があります。 任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。

任意接種の接種できる年齢

もすすめ接種時期(数字は接種回数)

(・○・) 添付文書に記載のないおすすめ接種時期 (※) 添付文書に記載はないが、接種を推奨 ●次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、 生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。 国や日本小児科学会も乳幼児の接種部位として太もも(大腿前外側部)も推奨しています。 詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

詳しい情報は http://www.know-vpd.jp/ VPD

◎ NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会

2017年4月作成

同時接種: 生ワクチン